

FLUIDIBRONC®

Carbocistéine

COMPOSITION

* Sirop Adultes :

Carbocistéine.....	5 g
Excipients q.s.p.....	100 ml
Excipient à effet notoire : saccharose	

* Sirop Enfants :

Carbocistéine.....	2 g
Excipients q.s.p.....	100 ml
Excipient à effet notoire : saccharose	

INDICATIONS

Traitement des troubles de la sécrétion bronchique, notamment au cours des affections bronchiques aiguës : bronchite aiguë et épisodes aigus des bronchopneumopathies chroniques.

CONTRE-INDICATIONS

- Hypersensibilité à l'un des constituants
- Enfant de moins de 15 ans (Sirop Adultes)
- Enfant de moins de 2 ans (Sirop Enfants)

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Utiliser avec précaution en cas d'ulcère gastro-duodéal.
- En raison de la présence de saccharose, ces médicaments sont contre-indiqués en cas d'intolérance au fructose, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou de déficit en sucrase-isomaltase.
- En cas de diabète ou de régime hypoglycémique, tenir compte dans la ration journalière de la présence de sucre : 2 g pour 5 ml de sirop Fluidibronc® Adultes et 3,5 g pour 5 ml de sirop Fluidibronc® Enfants.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT

Il est déconseillé d'utiliser ces médicaments en cas de grossesse et allaitement.

EFFETS INDESIRABLES

Possibilité de phénomènes d'intolérance digestive (gastralgies, nausées, diarrhées) : il est alors conseillé de réduire la dose.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES

L'association avec des antitussifs et des substances asséchant les sécrétions est déconseillée.

MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE

* Sirop Enfants :

- 2 à 5 ans : 1 cuillère à café, 2 fois par jour ;
- plus de 5 ans : 1 cuillère à café, 3 fois par jour.

* Sirop Adultes : 3 cuillères à soupe par jour.

FLUIDIBRONC®

Carbocisteine

COMPOSITION

* Adult syrup :

Carbocisteine.....	5 g
Excipients s.q.f.....	100 ml
Excipient with known effect: saccharose	

* Children's syrup :

Carbocisteine.....	2 g
Excipients s.q.f.....	100 ml
Excipient with known effect : saccharose	

INDICATIONS

Treatment of problems with bronchial secretion, notably during acute bronchial illness: acute bronchitis and acute episodes of chronic bronchopneumonia.

CONTRA-INDICATIONS

- Hypersensitivity to one of the components
- Children under 15 years old (Adult syrup)
- Children under 2 years old (Children's syrup)

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Use with caution in case of peptic ulcer.
- Due to the presence of saccharose, these drugs are contra-indicated in case of fructose intolerance, glucose-galactose malabsorption or sucrase-isomaltase insufficiency.
- In case of diabetes or low-carbohydrate diet, take account, in the daily ration, of sucrose content : 2 g per 5 ml of Fluidibronc® Adult syrup and 3.5 g per 5 ml of Fluidibronc® Children's syrup.

PREGNANCY AND BREAST-FEEDING

Administering these medicines is inadvisable during pregnancy and breast-feeding.

SIDE EFFECTS

Possible cases of digestive intolerance (gastralgia, nausea, diarrhoea): it is then recommended to reduce the dose.

DRUG INTERACTIONS

Combination with antitussive drugs and substances which dry secretions is inadvisable.

MODE OF USE AND POSOLOGY

* Children's syrup :

- 2 to 5 years old : 1 teaspoonful, twice a day.
- Over 5 years old : 1 teaspoonful, 3 times per day.

* Adult syrup : 3 tablespoonfuls per day.

FORME ET PRESENTATION

Sirop Adultes : Flacon en polyéthylène de 250 ml.

Sirop Enfants : Flacon en verre de 125 ml.

CONDITIONS DE CONSERVATION

Conserver à une température inférieure à 25°C.

Vente libre

Fluidibronc® Adultes

AMM : n° E-2005-215

Fluidibronc® Enfants

AMM : n° E-2005-216

FORM AND PRESENTATION

Adult syrup : 250 ml polyethylene bottle.

Children's syrup : 125 ml glass bottle.

STORING CONDITIONS

Store below 25°C.

OTC drug

Fluidibronc® Adults

AMM : n° E-2005-215

Fluidibronc® Children

AMM : n° E-2005-216

La date de péremption indiquée se réfère au produit correctement conservé dans le conditionnement intact
The indicated expiration date concerns the product correctly conserved in the intact bottle



25 B.P. 276 ABIDJAN 25 - Côte d'Ivoire
olea@umaline.com